


FRAMBOISIERS



● - EXIGENCES

De tous les arbustes à baies, le framboisier se montre le moins exigeant et tolère pratiquement tous les sols.

Les meilleurs rendements sont toutefois obtenus en terre fertile et fraîche. L'enracinement du framboisier étant superficiel il est important de pratiquer des apports annuels d'engrais à dominante phospho-potassique (exemple 7.14.10. à raison de 10 kg/100 m²). Le framboisier a besoin d'humidité, par été sec un arrosage est bénéfique.

● - DISTANCE DE PLANTATION

1 m sur le rang et 2 m entre rangs, soit 50 plants/are. Le framboisier est une plante vivace restant en place une dizaine d'années. Il est conseillé de planter de novembre à mars.

● - TAILLE

1 - Variétés non-remontantes : supprimez au ras du sol aussitôt après la récolte, en août ou septembre, les rameaux ayant fructifié et les jeunes tiges en surnombre. Parmi les rejets de l'année, supprimez au ras du sol les plus chétifs et conservez les 8 ou 10 plus vigoureux.



2 - Variétés remontantes : pour une récolte échelonnée, coupez en hiver l'extrémité des pousses ayant fructifié en automne. La partie inférieure fructifiera en juillet de l'année suivante. Après la récolte d'été, coupez la tige entière. De jeunes rejets prennent la relève. Pour ce qui est des jeunes tiges, procédez comme pour les non-remontants : supprimez celles en surnombre pour conserver dix à douze tiges de remplacement sur le rang.

● - INSECTES ET MALADIES (matières actives)

1 - INSECTES : - Cécidomyie des tiges : brûler les tiges atteintes.

- Pucerons : Deltaméthrine.
- Anthonome du framboisier : Deltaméthrine.
- Ver des framboisiers : Deltaméthrine ou Roténone.
- Araignée jaune : Dicofof.

2 - MALADIES : - Dessèchement des tiges : Cuivre.

- Anthracnose : Cuivre ou Mancozèbe.
- Blanc : Soufre ou Myclobutanil.
- Pourriture grise sur fruit : Fenhexamid.




Fig : Plantation d'un drageon de framboisier.

CASSEILLE

Hybridation d'un cassis et d'une groseille à maquereau. Les gros grains (1 cm environ) n'ont pas de pépins. Se récolte en juin-juillet. Après 3 ans de plantation, chaque plante peut produire de juin à octobre 8 à 10 kg de fruits. Les casseilles sont des plantes rustiques très vigoureuses, atteignant une hauteur de 1m 20 à 1m 50. Placer en situation ensoleillée ou mi-ensoleillée. Taille en fin d'hiver en conservant seulement les pousses de l'année précédente.

MYRTILLE DES JARDINS

Nouveauté sensationnelle d'origine américaine, qui a fait ses preuves. Surnommée myrtille des bois, bleue ou airelle.

Les myrtilles ont beaucoup d'amateurs. Elles se cueillent aisément sur de petits arbustes qui atteignent parfois 2 m de haut. Il n'est pas rare qu'un seul pied produise 10 kg de fruits et cela pendant 30 ans.

Poussant dans les terrains frais et acides, comme les azalées et rhododendrons, la myrtille est aussi un magnifique arbuste d'ornement qui, au printemps se couvre d'une multitude de fleurs blanches et se pare à l'automne de feuilles rouge feu jusqu'aux premières gelées.

Pensez que vous garderez cet arbrisseau pendant une trentaine d'années et qu'il vous apportera des fruits doux et savoureux.


● - EMPLACEMENT

Choisir un endroit ensoleillé de votre jardin ; faire un trou de 40 à 50 cm de profondeur et le combler avec un mélange composé de tourbe ou de terre de bruyère, de fumier décomposé et, si possible, de sciure, de copeaux de bois de chêne, ou encore, au départ de la végétation, ajouter un produit antichlorose. L'arrosage est très important, et l'apport d'un engrais complet n'est pas négligeable en été.

La taille consiste à enlever le vieux bois à partir de la troisième année. Traitements en cours de végétation identiques à ceux du framboisier. Pour favoriser la fructification, il est recommandé et préférable de planter 2 pieds à quelques mètres l'un de l'autre.

● - DISTANCE DE PLANTATION

1,50 m sur le rang, 2 m entre rangs. Nous livrons des touffettes de plusieurs années de culture, parfaitement racinées (et non pas des boutures de l'année).



Taille d'hiver du groseillier
à chaque taille, supprimer une branche trop âgée (a) et prenez un gourmand de remplacement (g) qui sera coupé à 15 cm.

GROSEILLIERS, CASSISSIERS

Les groseilliers et cassissiers ont à peu près les mêmes exigences que le framboisier, tant pour leur culture que pour leur traitement en cours de végétation.

● - DISTANCE DE PLANTATION

1 m à 1,20 m en tous sens, soit 50 plants/are.

● - TAILLE

La première année, on taillera très court de manière à faciliter l'enracinement. La touffe sera ensuite conduite en forme évasée en conservant les rameaux extérieurs

pour constituer des branches fruitières et assurer le renouvellement du bois par des pousses venant directement du pied. Chaque année, une taille très légère consistera à éliminer le bois improductif ou en surplus.



Suite pages 12

MURE GEANTE DES JARDINS SANS EPINE

Cette mûre des jardins est une amélioration de la mûre sauvage. Plante sarmenteuse qu'il est nécessaire de palisser. Des rameaux de 2 à 3 mètres se forment déjà la première année ; en deuxième et troisième année, ils peuvent atteindre 5 à 10 mètres. Les tiges ont un diamètre de base de 2 cm environ. Variété de mûre sans épine qui se distingue par ses fruits solides et de bonne qualité.

Puissante et décorative par ses feuilles laciniées, ses fleurs et ses fruits, cette mûre sans épine peut garnir rapidement et très joliment une pergola ou une palissade.

Tous les terrains lui conviennent, résistante aux gelées d'hiver. Très fructifère, les fruits ressemblent à nos mûres sauvages, mais en plus gros, et sont aussi délicieusement parfumés. La production abondante peut atteindre, en deuxième année de culture, plusieurs kilos de fruits par pied pour atteindre, en troisième année, 6 à 8 kilos, voire 15 à 20 kilos les années suivantes.

● - PLANTATION

Préparation du sol en y incorporant du fumier bien décomposé. Chaque année faire un apport de compost ou de fumier en surface. Distance de plantation : 2 à 4 m en fonction de la vigueur de la variété.

Il est recommandé d'enterrer le greffon au niveau du sol.

● - **Durée d'une plantation** : 12 à 15 ans

● - **Date de récolte** : Fin juillet.

● - **Durée de la récolte** : 45 à 50 jours.


● - TAILLE

En deuxième année, la taille consiste à supprimer durant l'hiver le bois qui a produit les fruits. Les jeunes pousses qui se sont formées produiront l'année suivante.

Le départ de la végétation, comme pour la mûre sauvage, est assez tardif selon les régions et l'exposition.

● - TRAITEMENTS EN COURS DE VÉGÉTATION

Identiques à ceux du framboisier.



ACTINIDIA DE CHINE (ACTINIDIA CHINENSIS)

Plante grimpante ornementale très vigoureuse, qu'il est nécessaire de palisser.

Produit des fruits poilus, très riches en vitamines C.

Très rustique à planter en sols profonds. Il faut obligatoirement planter un pied mâle et un pied femelle au minimum, mais un pied mâle suffira pour polliniser six ou sept pieds femelles.

Distance de plantation : 4 à 6 m. Récolte en novembre.

La fumure est importante en raison de la vigueur de la plante et doit être apportée en automne (engrais à dominante phospho-potassique).

Taille : la plante est exubérante, coupez les branches secondaires à 1 m de longueur et renouvelez l'opération l'année suivante pour les rameaux qui en sont issus.

Excellente et longue conservation en réfrigérateur (+ 2° à - 5°C).

